

四庫全書

子部

欽定四庫全書

子部

普濟方卷一百四十九

詳校官太醫院恩糧臣孔毓秀

編修臣倉聖脈覆勘

總校官庶吉士臣何思鈞

校對官典簿臣劉景岳

謄錄監生臣費元震

欽定四庫全書

普濟方卷一百四十九 明

周王朱橚撰

時氣門

時氣發狂論

夫時氣發狂者由熱毒氣盛則棄衣而走登高而歌或不食數日踰垣上屋非是素所能也皆陰陽爭氣外并於陽四肢者諸陽之本也熱盛則四肢實則能登高而歌熱盛於身故棄衣而走狂言妄見聞皆熱毒氣盛所

為也

方

梔子散

出聖惠方

治時氣熱毒攻心面目俱赤發狂不識

人

梔子仁

歲莖

茯苓

麥門冬

去心

知母

川升麻

黃芩

犀角屑

沙參

去蘆

川大黃

剉碎微炒

甘草

炒微赤剉各一兩

右為散每服四錢以水一中盞煎至六分去滓不計

時候溫服

治時氣心神狂躁言語無度

出聖惠方

鷄子

二枚
取清

白蜜

半合

生地黄汁

一合

川大黃

半兩剉碎
微炒杵

右相和令勻頓服之以利為度

白蘚皮散

白蘚皮

一兩半

大青

羚羊角屑

玄參

梔子仁

子芩

川大黃

剉碎
微炒

甘草

炙微赤剉

地骨皮

各三分

右為散每服五錢以水一大盞煎至五分去滓不計

時候溫服

又方

出聖惠方

麥門冬

三兩去心

杏仁

二兩湯浸去皮尖雙仁麩炒微黃

甘草

一兩炙微赤剉

白蘚皮

二兩

黃芩

一兩

生乾地黄

二兩

右為散每服五錢以水一大盞入葱白二莖煎至五

分去滓不計時候溫服

犀角散

出聖惠方

治時氣熱毒攻心發狂煩亂不得睡卧

犀角屑

龍齒

子芩

沙參

去蘆頭

歲莖

麥門冬

去心

川升麻

杏仁

湯浸去皮尖雙仁麤炒微黃

赤茯苓

赤芍藥

各一兩

大青

枳殼

麤炒微黃去瓢

甘草

炙微赤剉各三分

右為散每服五錢以水一大盞煎至五分去滓不計

時候溫服

治時氣發狂叫呼不識人

出聖惠方

黃連

去髮

秦艽

去苗

梔子仁

各一兩

鐵粉

二兩

右為散每服不計時候以新汲水調下二錢

又方

出聖惠方

梔子仁

半兩

豉

合一

葱白

五莖

右以水二大盞煎去滓分溫二服

治時氣發狂

出聖惠方

寒水石

馬牙硝

各一兩

右細研如麴不計時候以新汲水調下一錢

又方

出聖惠方

秦艽

去苗

大青

甘草

炙微赤剉各半兩

右為散不計時候以生地黃汁調下二錢服

治時氣熱盛癲狂或時昏沈

出聖惠方

寒水石

半兩

硃砂

鉛霜

各一分

右俱研如粉以軟飯和丸如梧桐子大每服不計時候以溫水下十丸

治時氣得汗後心神狂亂

出聖惠方

鐵粉

半兩

野豬糞

麤炒半兩

生地黄

二兩燒灰

右為末以粟米飯和丸如梧桐子大不計時候以人

參湯下二十丸

大黃丸

出聖惠方

治時行氣已得汗熱毒不解心煩躁悶

言語不定小便赤澁大便不通狂亂欲走

大黃

二兩剉碎微炒

黃芩

一兩半

梔子仁

一兩半

大青

二兩

龍膽

一兩去蘆頭

川朴硝

二兩細研

苦參

一兩
剉

右為末入朴硝勻煉蜜和搗三五百杵丸如梧桐子

大不計時候以麥門冬湯下三十丸

鐵粉丸

出聖
惠方

治時氣熱毒心神發躁狂亂欲走

鐵粉

一兩
研

犀角屑

一兩

硃砂

半兩
細研

苦參

一兩
剉

甘草

二兩
剉
生用

朴硝

一兩
細研

右為末令勻煉蜜和丸如梧桐子大不計時候以人

參湯下三十丸

又方

出聖
惠方

以藍錠半大匙用新汲水一盞調令勻頓服之

治時氣天行發狂熱疾

用糞清以臘月截淡竹去青皮浸滲取汁服

鎮心散 治時氣汗後發狂

用緊白龍骨不拘多少為細末每服二錢新汲水調

下效

治天行病六七日熱盛心煩狂見鬼者

右絞人屎汁飲數合一方治時行大熱狂走用多年

乾者搗末沸湯沃汁服之

治瘟病大熱狂言

出本草

取白頸蚯蚓破去土鹽拌日暴須臾成水飲其汁皆

差

若患天行熱狂

出本草

以甘蔗搗絞汁服甚良

治天行熱狂煩悶消渴

出本草

以芭蕉根絞汁服之

除煩悶解時疾狂熱退胃腸熱及消酒毒

出本草

用小麥苗絞汁服之

時氣發斑論

夫時氣在表已發汗未解或吐下後毒氣不散煩躁謬語此為表虛裏實氣躁於外故身體發斑如錦文凡發斑不可用發表藥令瘡開泄更增斑爛虛故也

方

升麻散

出聖惠方

治時氣表裏不解熱毒在臟致斑瘡

升麻

犀角屑

玄參

秦艽

去苗

子芩

柴胡

去苗

杏仁

湯浸去皮尖雙仁麤炒微黃

甘草

炙微赤剉各一兩

右為散每服五錢以水一中盞煎至五分去滓不計

時候溫服

又方

出聖惠方

玄參

川升麻

甘草

炙微赤剉各一兩

右為散每服五錢以水一大盞煎至五分去滓不計

計時候溫服

羚羊角散

出聖惠方

治時氣壅毒不退發斑徧身煩熱大

小便不利

羚羊角屑

梔子仁

麥門冬去心

玄參

川麻黃

川大黃

剉碎微炒

黃芪剉

赤芍藥

甘草

炙微赤剉各一兩

右為散每服五錢以水一大盞煎至五分去滓不計

時候溫服

葛根散

出聖惠方

治冬溫未即為病至夏得熱其冬溫毒

氣始出肌中斑爛癰疹如錦文喘欬悶嘔吐清涎

葛根

剉

陳橘皮

湯浸去白瓤焙

麻黃

去根節

知母

黃芩

杏仁

湯浸去皮尖雙仁麩炒微黃

甘草

炙微赤剉各一兩外臺秘要用各二兩

右為散每服五錢以水一大盞入生薑半分煎至五

分去滓不計時候溫服外臺秘要切以水七升煮取

三升分溫三服嘔吐當先定後便宜消息忌海藻松菜名

葛根橘皮湯

治時氣赤斑瘡出後胃中惡熱瘡盛

出聖惠方

鷄子

二枚
去殼

醎醋

二合

猪膽汁

三合

右藥相和煎十餘沸放溫不計時候分溫三服

治時氣熱毒在臟腑中欲發赤斑

出聖惠方

地黃汁

五合

豉

二合

麝香

一錢
細研

右於鍋中以鍊成猪脂半斤相和煎十餘沸濾去滓入麝香攪令勻每服二合盡服之毒當從肉中為

汗出便愈

又方

出聖惠方

以生蝦蟇一枚去腸肚爛研以水一大盞絞取汁頓服之或五月五日午時收者燒灰細研冷水調服並佳

治天行熱病若發赤黑斑如疹

出聖惠方

用青木香二兩以水二升煮取一升頓服之效

卑膏湯

出聖惠方

治時行溫毒發斑大疫難救病源夫人

冬月觸冒寒毒者至春始發病初在表或已發汗
吐下而表證未罷毒氣不散故發斑瘡又冬月天時
溫暖人感乖候之氣未即發病至春又被積寒所折
毒氣不得泄至夏遇熱其春寒解冬溫毒始發出於
肌膚斑爛癰疹如錦文也

生地黃

半觔切
打碎

好豉一升

右以猪膏二斤合前藥煎五六沸令三分減去滓研
雄黃麝香如大豆者內中攪勻盡服之毒便從皮中

出則愈忌蕪荑

黑奴丸

出肘後方

治溫毒發赤斑者五死一生黑斑者十死

一生大疫難救

方見本門時氣六日類黑奴丸同

治天行斑瘡須臾遍身皆戴白漿此是惡毒氣

用冬葵菜葉煮以蒜齋啖之則止

治天行時病發斑瘡頭面及身須臾周匝狀如火燒瘡皆戴白漿隨沒隨生不治數日必死治後瘡盤黯黑一歲方減此惡毒之氣所為

用水煮升麻綿漬洗之酒煮尤妙但痛難忍

黃連橘皮湯

出活人書

治冬溫未即病致春被積寒所折

不得發至夏熱其春寒解冬溫毒始發出肌中斑爛
癰疹如錦紋而欬心悶嘔吐清汁眼赤口瘡下部亦
生瘡

黃連

四兩去鬚

橘皮

杏仁

去皮尖雙仁

麻黃

去節

枳實

炙亦用枳殼

葛根

各二兩

厚朴

炙

甘草

炙各一兩

右剉以水八升煮取三升分三服令盡且稍息下當

先止忌猪肉冷水海藻松菜等

漏蘆橘皮湯 治冬溫未即病至春被積寒所折不得

發至夏熱其春寒解冬溫毒始發出肌中斑爛癰疹

如錦紋而欬心悶嘔吐清汁眼赤口瘡下部亦生瘡

漏蘆 橘皮 甘遂 麻黃

去節

杏仁

去皮尖
雙仁

黃芩

各二
兩

右剉以水九升煮取三升分四服得下為佳下後餘
外證未除更服葛根橘皮湯方在前小品方忌海藻

松菜等一方有知母枳實白薇升麻大黃甘草為十
二味

治天行發斑瘡頭面及身須臾周匝狀如火瘡皆戴白

漿隨沒隨生若不急治數日即死

方見本門時氣發
豌豆瘡類治時行

病發
瘡

治時氣發瘡癰

用葡萄研酒食之甚效

治時氣行病發瘡

用升麻五兩以水二升入蜜同煎三沸半服半傳瘡
上差

時氣發豌豆瘡論

夫時氣發豌豆瘡者是熱毒氣攻於臟腑餘氣流於肌
肉遂於皮膚毛孔之中結成此瘡所出如豌豆顆因以
名之但以解熱毒之藥其瘡即止脉洪數者是其候也
方

犀角散

出聖
惠方

治時氣發豌豆瘡出後疼痛心神煩悶

犀角屑 丁香 薑陸香 木香

各半兩

玄參 川升麻

各一兩

麝香

一分

右為散每服二錢以水一中盞煎至五分去滓不計

時候服

又方

出聖惠方

用黃連二兩去鬚為散每服三錢以水一中盞煎至

五分去滓不計時候溫服

治時氣發豌豆瘡如爪甲大赤黑色者

出聖惠方

羊膽

七枚
取汁

羊脂

三兩

右二味相和於銀鍋中煎五七沸待冷摩傳瘡上日

四五用之

又方

出活
人書

用川芒硝二兩細研以猪膽汁和塗於瘡上勿令動
著直候痂落無癰仍卧黃土末上良此病小便澀有
血者中壞也瘡皆黑靨不出膿者死不瘳

治時氣發豌豆瘡

出聖
惠方

以好白蜜通身塗於瘡上亦可救數食蜜如瘡爛痛
可用細研黃土傳之

治時氣熱毒攻發豌豆瘡

出聖
惠方

用苦參二兩細剉以水二大盞煎至一盞去滓分為
二服日三四服之

治時氣發豌豆瘡初覺

出聖
惠方

用川大黃半兩剉碎微炒以水一大盞煎至七分去
滓分為二服日三四服之

又方

出千金方

用青黛半兩細研以新汲水調服之日三四服一方用

真波斯青黛大如棗

又方

出千金方

用木香一兩搗碎以水一大盞煎至六分去滓不計時候溫服之聖濟錄用二兩以水三升煮取一升頓服之

治時氣發豌豆瘡亦治六畜時氣熱病

出千金方

用濃煮黍穰汁洗之若誤使穢穰不即差聖濟總錄
瘡若黑者搗蒜封之

治傷寒時氣熱毒豌豆瘡

出如切
新書

用樺皮木剉煎汁溫服取安

又方 治時氣熱病豌豆瘡

用雲臺煮汁洗之

又方

出千
金方

若赤黑發如芥大者煎羊脂摩傳之

又方

出千金方

用小豆屑鷄白和傅

又方

出千金方

用婦人月水帛拭之

又方

出千金方

小兒著用取月水汁和水浴之

治時行病發瘡

出肘後方

用好蜜遍身摩瘡上亦可以蜜煎升麻摩之并數數

拭之外臺秘要肘後比歲有病天行發斑瘡頭面及身須臾周匝狀如火瘡皆戴白漿隨沒隨生不即療刺者數日必死得差後瘡癰紫黑黯彌歲方滅此惡毒之氣也世人云以建武中於南陽擊虜所得仍呼為虜瘡諸醫忝詳治療用之有效

治傷寒時行熱毒發瘡頭面及身須臾周匝狀如火瘡皆帶白漿隨沒隨生

葵菜

煑爛

蒜齏

各不拘多少

右拌勻初患急食之不早治殺人但差後瘡癰色黑
彌歲方滅此是惡毒時氣也

又方

出肘
後方

用水濃煮升麻汁漬綿洗之若酒漬彌佳但燥痛難
忍也

水解散 治天行熱氣則生庖瘡疼痛解肌出汗

麻黃

一兩
去節

黃芩

芍藥

桂心

各二
分

右搗篩煖水調服二方寸匕覆令出汗日再服差者

減之忌海藻松菜

龍腦散 治時疾天行豌豆瘡赤瘡子未透心煩狂躁
氣喘妄語或見神鬼

以龍腦一錢細研旋滴猪心血和丸如鷄頭大每服
一丸紫草湯下少時心神便定得睡復發透依常將
息取安

治時氣病骨中熱生豌豆瘡庖瘡

飲鐵漿瘥

治豌豆瘡

出本草

服油麻一升須利即不生白漿大效

又方

用蔓菁根搗汁挑瘡破傅在上三食時

時氣口瘡論

夫時氣發汗吐下之後表裏俱虛毒氣未散攻心脾上焦熱燥故口舌生瘡也

方

升麻散

出聖惠方

治時氣熱盛口中生瘡

川升麻

木通

剉

射干

麥門冬

去心

蘆根

羚羊角屑

一兩

右為散每服五錢以水一大盞煎至五分去滓不計

時候溫服

大青散

出聖惠方

治時氣咽痛口瘡煩躁頭重

大青

黃芩

川升麻

麥門冬

去心

梔子仁

甘草

炙微赤剉各一兩

右為散每服四錢以水一中盞入竹葉三七片煎至六分去滓不計時候溫服

麥門冬散

出聖惠方

治時氣熱盛昏沈如醉及腹脇痛百

節痠疼舌裂生瘡

麥門冬

一兩去心

川升麻

三分

柴胡

一兩去苗

赤芍藥

三分

淡竹葉

三分

甘草

三分微黃剉

石膏

二兩

豉

二合

右為散每服五錢以水一大盞入葱白二莖煎至五

分去滓不計時候溫服

治時氣心脾臟熱毒舌裂滿口生瘡

出聖惠方

川升麻

一兩

黃蘗

半兩劉

苦竹葉

半兩

射干

三分

大青

半兩

龍膽

玄參

生乾地黄

各半兩

右為散每服五錢以水一大盞煎至五分去滓入蜜

半合攪勻不計時候徐徐含嚥之

犀角散

出聖惠方

治時行氣心脾臟熱毒上衝徧口生瘡

大青

半兩

犀角屑

玄參

各一兩

胡黃連

半兩

川升麻

甘草

生用各三分

右為散每服五錢以水一大盞煎至五分去滓不計時候溫服

黃連散

出聖惠方

治時氣兼口舌生瘡

黃連

一兩去須

川大黃 川升麻

黃芩

甘草

生剉各三分

右為散每服五錢以水一大盞煎至五分去滓不計

時候溫服

治時氣壅熱口内生瘡

出聖惠方

黃連

一兩半
去鬚

甘草

生劉

麥門冬

去心

玄參

柴胡

去苗各
一兩

右為散每服五錢以水一大盞煎至五分去滓不計

時候溫服

酪酥煎

治天行熱盛口中生瘡病既發汗表裏俱

虛而毒氣未盡薰蒸上焦故喉口生瘡

酪酥

蜜各三分

大青一兩

右三味合煎三沸稍稍傳口以差為度

又口瘡方 治天行熱甚口中生瘡

取蛇莓五升搗絞取汁稍稍飲之一方絞汁一斗煎取五升飲之

升麻湯 治天行時熱病口瘡

升麻二兩

通草四兩

射干二兩

芍藥三兩

生蘆根切一升

羚羊角屑三兩

右切以水七升煮取三升分為三服如人行五里時更服

柴胡湯 治天行病後乍寒乍熱昏昏不省覺脇下痛百節骨疼不能下食兼口舌乾生瘡

柴胡

八分

升麻

芍藥

黃芩

麥門冬

去心

香豉

綿裹

生薑

各六分

甘草

五分

石膏

十三分綿裹

葱白

十

竹葉

切一升洗

右切以水九升煮取二升五合絞去滓分溫三服如

人行六七里進一服不吐不利差忌海藻松菜熱麪
油膩

治天行熱盛口中生瘡

用黃柏皮削去上粗皮取裏好處入薄荷蜜漬之一
宿惟欲令濃含其汁良吐更含若胃中熱有瘡時飲
三五合尤佳

時氣結胃論

夫時氣結胃者謂熱毒氣結聚於心胃也此由病發於

陽而下之太早熱毒之氣乘虛而痞結按之乃痛其寸口脉浮關上脉沉細是也脉大不下下之即死脉沈而大下之為逆若陽脉浮關上沈緊者名為臟結病舌上白胎滑者難治不往來寒熱其人反靜舌滑者不可攻之也

方

桂心散

出聖惠方

治時氣結胃心下堅實滿痛

桂心

一兩

甘遂

半兩煨
今微黃

人參

一兩去
蘆頭

蘇蘇

一枚取
子用

右為散每服三錢以水一中盞入棗三枚煎至五分

去滓不計時候溫服

猪苓散

出聖
惠方

治時氣結胃心下滿實煩悶

猪苓

一兩去
黑皮

澤瀉

一兩

桂心

半兩

赤茯苓

三分

川朴硝

三兩

右為散不計時候以粥飲湯調下二錢

臨胃湯

出聖
惠方

治時氣結胃心下堅實按之即痛其脉

沈滑

蓴蓴

一枚大者取子

黃連

去

半夏

湯浸七次去滑各一兩

右為散每服五錢以水一大盞入生薑半分煎至六分去滓不計時候溫服

檳榔丸

出聖惠方

治時氣結胃煩悶喘急

檳榔

半兩

馬蘭花

一分微炒

甜葶藶

半兩隔紙炒令赤色

猪牙皂角

半角去皮炙令黃焦

右為末煉蜜和丸如梧桐子大每服不計時候以竹

葉湯下二十九

苦參丸

出聖
惠方

治時氣結胃熱毒在內

苦參

半兩
劉

黃連

一兩
去須

黃芩

一兩

川大黃

一兩到
碎微炒

梔子仁

半兩

右為末煉蜜和丸如梧桐子大每服不計時候以竹葉湯下二十九

陷胃丸

出聖
惠方

治時氣結胃實熱在內其脉沈堅心下

痛滿按之如石

川大黃

三兩剉
碎微炒

甜葶藶

二兩剉
碎微炒

川芒硝

二兩

杏仁

二兩湯浸去皮
尖麤炒微黃

右為末煉蜜和丸如彈子大每服一丸用甘遂末半錢蜜一小匙水一中盞同煎至七分溫溫化丸藥不計時候服之以利為度

治時氣熱毒在胃膈六七日垂死者破棺

名千金煮湯
出聖惠方

用苦參一兩剉搗碎以酒二大盞去滓看冷煖得所
不計時候都為一服服後當聞苦參氣即吐毒如羊

膽汁便愈一方以醋二升煮取一升二合盡飲之當

吐即愈天行毒病非苦參醋藥不解及溫覆取汗愈

一方救急療天行嘔逆不下食食入即出下又方同

見方

本門後時
氣嘔逆類

凝雪湯

出
人
存方

治時氣行毒病七八日熱結在胃中煩

亂欲死

用莞花一升以水三升煮一升半漬布薄膈上不過

三薄熱則除當溫煖四肢護厥也

萬金丸

出王氏
博濟方

治時氣及疎理臟腑通利胃腸調順

榮衛

木香

乾薑

炮

大黃

生

陳橘皮

湯浸去瓤
各一兩

巴豆

去皮膜一兩冷水浸一宿焙乾
研令細或與前藥一處搗羅

右藥五味同細搗羅為末用沙糖為丸如梧桐子大
患者三日外酌其毒氣傳入未曾疎利不計時早晚
以粥飲下五丸如藥未行熱茶投之上有疾即吐下
有疾即瀉汗出或吐瀉不止即以黃連湯止之老幼

虛實加減凡散懷身人不得與喫此藥有返魂之功
如四季覺熱但有此藥踈轉自然不染時氣若患常
惡轉於五更時亦用粥飲下

治時氣熱毒在胃腸六七日垂死者破棺

以鷄卵一枚煮三五沸出以水漬之外熱內熱則吞
之良

時氣欬嗽論

夫時氣欬嗽者由熱邪客於肺則上焦有熱心胃煩躁

咽乾頭痛其人必飲水停心下則上乘於肺故上氣欬嗽也其脉洪數者是其候也

方

麥門冬散

出聖惠方

治時氣心胃痰嘔虛煩欬嗽時時氣

促

麥門冬

一兩去心

人參

三分去蘆頭

葛根

一兩剉

桔梗

去蘆頭

前胡

去蘆頭

半夏

湯浸七遍去滑各三分

貝母

炙微黃

甘草

三分炙微赤剉

右為散每服五錢以水一大盞入生薑半分煎至五分去滓不計時候溫服

木通散

出聖惠方

治時氣欬嗽咽喉不利心胃煩悶

木通

剉

桑根白皮

剉各一兩

葛根

剉

射干

紫苑

去苗土各三分

馬兜鈴

半兩

半夏

一兩湯浸去滑七遍

右為散每服五錢以水一大盞入生薑半分煎至五分去滓不計時候溫服

天門冬散

出聖惠方

治時氣肺虛熱壅氣喘欬嗽

天門冬

去心

紫苑

去苗土

赤茯苓

甘草

炙微赤剉

陳橘皮

湯浸去白焙

桑根白皮

剉

杏仁

湯浸去皮尖雙仁麩炒

人參

去蘆三分

麻黃

半兩去根節

右為散每服五錢以水一大盞入生薑半分煎至五

分去滓不計時候溫服

欬冬花散

出聖惠方

治時氣發熱欬嗽煩躁或時時氣喘

欬冬花

一兩

天門冬

三分去心

黃芪

一兩

石膏

半 一兩

紫苑

去苗
土二兩

甘草

三分炙
微赤剉

杏仁

湯浸去皮尖雙仁
麩炒微黃一兩

麻黃散

出聖
惠方

治時氣頭痛欬嗽煩悶

麻黃

去根
節

黃芪

剉各
一兩

石膏

半 一兩

天門冬

三分
去心

人參

去蘆
頭

杏仁

湯浸去皮尖
生用各一兩

甘草

三分剉
生用

右為散每服五錢以水一大盞入生薑半分煎至八

分去滓不計時候溫服

前胡散

出聖惠方

治時氣壯熱欬頭痛心悶

前胡

去蘆頭

川升麻

各二兩

百合

貝母

煨令微黃

紫苑

去苗土

桔梗

去蘆頭各兩半

石膏

三兩

麥門冬

二兩去心

甘草

半兩炙微赤剉

杏仁

一兩湯浸去皮尖雙仁麤炒微黃

右為散每服五錢以水一大盞入竹葉二七片煎至

五分去滓不計時候溫服

石膏散

出聖惠方

治時氣壯熱頭痛欬嗽

石膏

六兩

葛根

剉

百合

赤芍藥

貝母

煨令微黃

桔梗

去蘆頭

川升麻

詭蘇

各二兩

梔子仁

一兩

右為散每服五錢以水一大盞入葱白二莖豉五十粒煎至五分去滓不計時候溫服

生乾地黄散

出聖惠方

治時氣肺熱欬嗽喉中生瘡

生乾地黄

川升麻

元參

赤芍藥

紫苑

去苗土

柴胡

去苗

天門冬

去心

麥門冬

去心
二兩

貝母

一兩半
煨
今微黃

右為散每服五錢以水一中盞煎至五分去滓入蜜

半匙更煎沸不計時候溫服

紫苑散

出聖
惠方

治時氣欬嗽

紫苑

二兩半
去苗土

貝母

二兩
煨
今微黃

甘草

炙微
赤剉

桑白皮

剉

麥門冬

去心

人參

去蘆頭
各一兩

陳橘皮

半兩湯浸
去白瓢焙

杏仁

一兩半湯浸去皮
尖雙仁麩炒微黃

右為散每服五錢以水一中盞煎至五分去滓不計

時候溫服

柴胡散

出聖
患方

治時氣熱未退塵滯虛羸欬嗽

柴胡

去
蘆

黃芩

桔梗

去
頭

玄參

地骨皮

各一
兩

麥門冬

一兩半
去心焙

赤茯苓

人參

去
頭

紫苑

去
苗

甘草

炙微黃
半兩

右為散每服四錢以水一中盞煎至五分去滓不計

時候溫服

治時氣肺熱胃膈壅滯欬嗽不止

出聖
患方

貝母

一兩煨
令微黃

紫苑

三分去
苗土

甘草

一分炙
微赤剉

右為散每服五錢以水一大盞煎至五分去滓不計

時候溫服

防風百解散 治傷寒風頭痛項強身體疼痛肌熱惡

寒咳嗽喘促老幼皆宜

麻黃

去根剉
三兩

甘草

剉炒

防風

各二
兩

蒼朮

半斤為
末炒黃

右為細末每服三錢以水一鍾半葱白三寸同煎七

分去滓溫服無時進二三服微汗周而已

地黃湯 治天行肺熱咳嗽喉有瘡

生地黃

升切一

升麻 元參 芍藥

柴胡

麥門冬

去心各八分

貝母

六分

竹葉

升切一

白蜜

合一

右切以水九升煮取三升絞去滓內蜜再煮三沸含咽勿停中間不防食下利忌蕪荑熱麪猪犬肉油膩
前胡湯 治天行壯熱咳嗽頭痛心悶病源熱邪壅於

肺上焦有熱其人必飲水水停心下則上乘於肺故上氣而咳也

前胡 升麻 麥門冬 去心各八分 貝母

紫苑 各六分 石膏 十二分碎綿裹 杏仁 三十粒去皮尖雙仁

竹葉 切一升 甘草 二分

右切以水八升煮取二升五合絞去滓分溫三服相去如人行六七里進一服不吐利差忌海藻松菜油膩猪肉等

生薑煎

出便良方

治天行病上氣咳嗽多唾黏涎日夜不

定

用生薑三兩去皮切如豆粒大以錫半斤和微煎令爛每日無間早晚少少含仍嚼薑滓一時噤之

治天行病後因食酒麪肺中熱壅滯遂成咳不止

桑白皮

十二分

桔梗

十分

麻黃

六分去節

肥乾棗

二十一枚擘

曹州葶藶子

十分熬令紫為膏湯盛下

右切以水四升煮桑白皮等四味可取一升半去滓

下葶藶子膏更煎三五沸去滓分溫五服空心食後服或利勿怪忌猪肉油膩生冷果子等物

華蓋散

出醫學切問

治傷風冒濕頭目昏重憎寒壯熱四

肢疼痛咳嗽失音涕唾稠粘不問老幼皆可服之

蒼朮

二兩

桔梗

厚朴

各一兩

杏仁

陳皮

烏梅

各半兩

麻黃

二錢

甘草

一兩

右為粗末每服三錢以水一盞生薑三片煎至七分去滓如發汗加蔥頭

時氣口乾論

夫時氣熱毒攻於心肺則膈上壅躁若胃中有熱則津液竭少咽喉不利頭目痛心煩故口乾也

方

葛根散

出聖惠方

治時氣經下後未退頭疼口乾煩躁恍

惚

葛根

剉

麥門冬

去心

黃芩

川升麻

甘草

炙微赤剉各一兩

石膏

一兩半

右為散每服四錢以水一中盞煎至六分去滓不計

時候溫服

赤茯苓散

出聖惠方

治時氣胃熱口乾煩燥渴不止

赤茯苓

菰藚根

麥門冬

去心

生乾地黄

各一兩

知母

半兩

右為散每服五錢以水一大盞入小麥五十粒淡竹

葉三七片煎至五分去滓不計時候溫服

蘆根散

出聖惠方

治時氣口乾

蘆根

二兩
剉

麥門冬

去心

黃芩

蘇蘇根

各一兩

甘草

半兩
炙
微赤剉

右為散每服二錢以水一中盞入竹茹一分煎至五分去滓不計時候溫服

又方

出聖惠方

石膏

人參

去蘆頭
各二兩

葛根

剉

麥門冬

去心
各一兩

右為散每服五錢以水一大盞入竹葉二七片煎至

五分去滓不計時候溫服

蓀蓀根散

出聖惠方

治時氣心脾壅熱煩悶口乾

蓀蓀根

犀角屑

川升麻

麥門冬

去心

葛根

剉

甘草

炙微赤剉

梔子仁

各三分

右為散每服五錢以水一大盞煎至五分去滓不計

時候溫服

治時氣口乾舌縮心神煩悶不得睡卧

出聖惠方

蓀蓀

一枚去殼留蓋去子留瓢

白蜜

竹瀝

酥

生藕汁

各一分

右相和勻內於蓀蓀中以麪裹火煨候麪黃熟即傾入器中放溫每服半合不計時候服

黃連丸

出聖惠方

治時氣煩悶口乾

黃連

去霜

蓀蓀根

知母

赤茯苓

各二兩

麥門冬

右為末鍊蜜和丸如梧桐子大每服不計時候以牛

乳下三十九

治時氣口乾喜睡

出聖惠方

乾棗

厚十二枚去核

烏梅肉

十枚微炒

甘草

炙微赤剉為末三錢

右入少蜜合搗令熟常含如杏核大嚥津

時氣熱毒攻咽喉論

夫時氣熱毒在臟陰陽隔絕邪熱客於少陰之絡毒氣上熏攻於咽喉故令腫痛或生瘡也

方

射干散

出聖惠方

治時氣熱毒上攻咽喉疼痛

射干 川升麻 麥門冬去心 甘草炙微赤剉

犀角屑

各二分

馬藺根

半兩

右為散每服三錢以水一中盞煎至六分去滓不計

時候溫服

前胡散

出聖惠方

治時氣熱毒上攻咽喉不利

前胡

去蘆頭

川升麻

各一兩

犀角屑

赤芍藥

甘草

炙微赤剉

天門冬

去心

絡石草

桔梗

去蘆頭

射干

枳殼

麩炒微黃去瓢各半兩

赤茯苓

杏仁

湯浸去皮尖雙仁
麩炒微黃各三分

右為散每服五錢以水一大盞煎至五分去滓不計

時候溫服

治時氣毒氣攻心咽喉疼痛煩悶

半夏

湯洗七遍去滑

桂心

射干

甘草

炙微赤判

麥門冬

去心

黃柏

右為散每服五錢以水一中盞入竹葉二七片煎至

五分去滓不計時候溫服

升麻散

出聖惠方

治時氣熱毒攻心咽喉腫塞不通

川升麻 木通 射干 赤芍藥

羚羊角屑 馬蘭根 甘草

炙微赤剉

杏仁

湯浸去皮尖雙仁麩炒微黃各一兩

右為散每服五錢以水一大盞煎至五分去滓不計

時候溫服

元參散

出聖惠方

治時氣熱毒上攻咽喉噎塞腫痛

元參 射干 川升麻 百合 前胡

去蘆頭

白蒺藜

微炒
去刺

犀角屑

枳殼

麩炒
微黃

杏仁

湯浸去皮尖
雙仁炒微黃

甘草

炙微
赤剉

桔梗

去蘆
頭

木通

剉

麥門冬

去心各
三分

右為散每服五錢以水一大盞煎至五分去滓不計

時候溫服

治時氣熱毒上攻咽喉噎塞不能下食

出聖
惠方

射干

川升麻

人參

去蘆
頭

陳橘皮

湯浸去
瓤焙

半夏

湯浸七
遍去滑

甘草

炙微赤
各一兩

右為末每服五錢以水一大盞煎至五分去滓不計

時候溫服

太陰玄精丸

出聖惠方

治時氣熱毒攻咽喉

太陰玄精

細研

川升麻

玄參

射干

寒水石

細研

甘草

炙微赤剉各半兩

馬牙硝

一兩細研

右為末都研令勻煉蜜和凡如小彈子大常含一丸

嚥津

治時氣毒氣攻咽喉閉塞不通名烏扇湯

出聖惠方

生烏扇

半斤切

猪脂

半斤

右相和煎五七沸絞去滓候冷常取如棗大含嚥之

治時氣熱毒攻咽喉腫痛

出聖惠方

以商陸根切搗令爛炒熱以手帕子裹熨咽喉腫處冷即復換

黃連馬通湯

治天行時毒病或下不止咽喉痛病源

陰陽隔絕邪客於足少陰之絡毒氣上熏攻於咽喉

疼痛生瘡

小豆

一升

黃連

去毛

吳茱萸

各一兩

馬通汁

三升

右以馬通汁合煮取一升盡服不差再服有效忌猪
肉冷水

青木香湯 治春夏忽咽喉痛而腫兼下痢

青木香

白頭翁

各二兩

黃連

一兩去毛

右切以水五升煮取一升半分溫三服小兒若病此
服一合忌猪肉冷水

時毒藥

出御藥
九方

治時疾生熱臃腫在咽喉間增寒壯

熱頭痛面目赤腫其狀若瘡竅相傳染無可救者並

宜服之

大黃

生用

寒水石

生用

當歸

各等分

右為細末每服二三錢至五錢無根水調下食後服
臨時觀虛實加減服之

石膏蜜煎 治天行熱病口苦下氣除熱喉中鳴

石膏

半斤

蜜

一分

右以水三升煮石膏取二升內蜜復煎取一升去滓含如棗核許

通氣散 治時氣頭面赤腫或咽喉閉塞不通用之取嚏噴七八遍洩出其毒則差若看病人用此藥必不傳染

玄胡

一兩半

蘼蘆

半兩

躑躅花

二錢半

猪牙皂莢

川芎

各一兩

右為細末用紙撚子蘸一米許絛於鼻中取嚏為效

時氣嘔逆論

夫時氣胃家有熱穀氣入胃與熱相并氣逆則嘔逆也
或吐下後飲水過多遇胃氣虛冷亦為嘔逆也

方

前胡散

出聖惠方

治時氣惡寒壯熱食則嘔逆

前胡

去蘆頭

麥門冬

去心

生乾地黄

葛根

劉各一兩

陳橘皮

湯浸去白瓤焙

甘草

炙微赤剉各半兩

右為散每服三錢以水一中盞入生薑半分煎至五

分去滓不計時候溫服

人參散

出聖
惠方

治時氣大下後胃氣虛冷嘔逆不止

人參

去蘆
頭

麥門冬

去心

草薢

各一兩

陳橘皮

湯浸去
白瓤焙

黃芪

剉

甘草

炙微赤剉
各一兩

右為散每服三錢以水一中盞煎至五分去滓不計

時候溫服

麥冬散

出聖
惠方

治時氣煩熱嘔逆不止

麥門冬

去心

蘆根

剉

人參

去蘆
頭

葛根

剉各二兩

陳橘皮

一兩湯浸去白瓤焙

右為散每服五錢以水一大盞煎至五分去滓不計

時候溫服

半夏散

出聖惠方

治時氣腹脇虛脹心膈壅滯嘔逆不能

食

半夏

湯浸七遍去滑

柴胡

去苗

黃芪

剉

赤芍藥

人參

去蘆頭

桂心

陳橘皮

湯浸去瓤焙

大腹皮

剉各一兩

右為散每服五錢以水一大盞入生薑半分棗三枚

煎至五分去滓不計時候溫服

治時氣心胃脹悶逆不下食

人參

去蘆頭

前胡

去蘆頭

甘草

炙微赤判

黃芩

赤茯苓

蘆根

判各一兩

枳實

麩炒微黃

木通

判各半兩

右為散每服五錢以水一大盞入生蘆根半兩煎至

五分去滓不計時候溫服

枇杷葉散 治時氣頭痛壯熱食即嘔逆

枇杷葉

拭去毛
火微黃

人參

去蘆
頭

黃芩

陳橘皮

湯浸去
白瓤焙

梔子仁

各
兩半

石膏

一
兩

右為散每服五錢以水一大盞入生薑半分棗三枚

煎至五分去滓不計時候溫服

陳橘皮散 治時氣壯熱嘔逆不下食

陳橘皮

湯浸去
白瓤焙

麥門冬

去
心

人參

去蘆
頭

甘草

炙微
赤剉

葛根

剉各
一兩

右為散每服五錢以水一大盞入生薑半分棗三枚

煎至五分去滓不計時候溫服

前胡散 治時氣嘔逆頭痛不能食

前胡

去蘆頭

蘆根

石膏

各一兩

犀角屑

葛根

剉

人參

去蘆頭

陳橘皮

湯浸去白瓤焙各三分

麥門冬

一兩半去心焙

甘草

一分炙微赤剉

右為散每服五錢以水一大盞入竹葉二七片煎至

五分去滓不計時候溫服

蘆根散 治時氣心胃妨悶嘔逆不下食

蘆根

一握
剉

前胡

去蘆
頭

甘草

炙微赤剉
各半兩

桔梗

一兩去
蘆頭

枇杷葉

半兩拭去
毛炙微黃

右為散每服五錢以水一大盞入竹葉二七片煎至

五分去滓不計時候溫服

犀角散 治時氣十日以上時有嘔逆欲得飲水此胃

中伏熱不散

犀角屑

三分

麥門冬

一兩半
去心焙

黃芩

川朴硝

蘆根

剉各
一兩

石膏

二兩

右為散每服三錢以水一中盞入竹青茹生薑半分煎至六分去滓不計時候溫服

治時氣嘔逆不下食

生薑汁

半兩

蜜

合

右相和令勻不計時候溫服

治時氣嘔逆欲死不下食兼主傷寒

半夏

半兩湯浸洗七遍去滑外臺秘要作五兩

生薑

一兩外臺秘要作八兩切令薄細勿令溫惡經水浸有好

右剉碎以水一大盞煎至六分去滓分二服不計時
候溫服外臺秘要方以水三升別煮各取一升半去
滓二汁相和一處共煎取二升分三服服相去如人
行十里久當令下食其噦不過俄頃此方得之明侍
御來豕來豕與方郎中隣居後乃得之大良效忌羊
肉餒

又方

以臘月兔頭并毛皮燒灰令煙盡搗細為散每服以

粥飲調下一錢不計時候頓服外臺秘要服方寸匕則下食不瘥更服燒之勿令大耗無所忌用此頻效

又方

以枇杷葉一兩拭去毛炙微黃為末每服二錢以水一中盞煎至五分去滓不計時候溫服

救急薤豉粥 治天行乾嘔若手足逆冷

薤白

切

香豉

各一升

白米

四合

右以水一升煮豉一沸漉去滓薤及米煮為稀粥進

兩碗良

無方名
原本缺

前胡

橘皮

甘草

炙各一兩

麥門冬

三兩去心

竹茹

生薑

各二兩

生地黃

四兩切

右切以水七升煮取二升三合絞去滓分溫三服服

如人行六七里進一服忌海藻菰菜蕪荑熱麪猪肉

油膩

小青龍湯

治天行數日或十許日而表不解心下有

水熱毒相搏作嘔時服有效者增損

麻黃

去節

芍藥

甘草

炙各二兩

桂心

細辛

各一兩

右切以水六升煮取二升溫服七合阮本湯方等分雖未嘗用嫌其太溫余增損其分兩以療十餘人皆愈忌海藻松菜生葱生菜等

橘皮湯 治天行壯熱嘔逆不下食

橘皮

茯苓

各三兩

生薑

四兩

右切以水五升煮取一升五合去滓分溫五六服中
間任食一日服盡忌大酢蒜麪

救急療天行嘔逆不下食入則出

出肝
後方

取羊肝如食法須淡食不過三兩度即止

又方

出肝
後方

以鷄子一枚於沸湯中煮三兩沸則出水津之外熱
內熱吞之神效

生蘆根湯 治天行後氣膈嘔逆不下食

燈心

一分

生麥門冬

十二分
去心

人參

四分

生蘆根

一大握切

右以水一大升煎取八合去滓分溫三服

茅根湯 治瘟病有熱飲水暴冷呃者

茅根

葛根

各切
半斤

右以水四升煮取二升稍溫飲之呃止則停

治瘟病熱未除重被暴寒入胃熱蘊結不散變呃者

以單煮梓皮稍稍飲之佳溫病積飲冷結胃中熱入

腎中變壯熱大呃者服梓皮溫呃得止者也夫腎中有熱者病瘥後足心皮膚喜剝脫去頭鬚禿落是其候也

治溫病有熱飲水暴冷枇杷飲子

枇杷葉

拭去毛

茅根

各半斤

右切以水四升煮取二升稍稍飲之

前胡湯 治時行疫癘壯熱惡寒食即吐逆

前胡

去蘆頭

生地黃

焙

麥門冬

去心焙

陳橘皮

湯浸去白焙

甘草

炙

人參

各半兩

右麤搗篩每服三錢匕水一鍾竹葉七片煎至七分

去滓溫服即差

柴胡湯 治時行病疫癘數日未得汗渾身壯熱嘔逆

不下食

柴胡

去苗

升麻

大黃

剉炒各一兩

桂

去粗皮

甘草

炙

枳實

去穢麤炒

知母

焙各三分

鼈甲

醋炙去裙襴一兩一分

梔子仁

一分

麻黃

去根節一兩半

右麤搗篩每服三錢匕水一盞半入生薑三片煎至七分去滓溫服

前胡湯 治時氣壯熱頭痛嘔逆

前胡

去蘆頭

知母

焙

犀角屑

鎔

葛根

判

赤芍藥

各一兩

石膏

二兩碎

右麤搗篩每服五錢匕以水一盞半入生薑三片拍碎葱白二寸切煎至八分去滓溫服不計時候

白朮湯 治時氣出汗吐下後四肢羸劣嘔逆減食

白朮

剉炒

黃芪

剉細

人參

厚朴

去粗皮生薑汁炙透

白茯苓

去黑皮

桔梗

剉炒

桂

去粗皮

陳橘皮

湯浸去白瓢

甘草

炙剉各一兩

右麤搗篩每服五錢匕以水一盞半煎至八分去滓

溫服不拘時候

治天行嘔逆吐不下食

用半夏半兩湯浸洗七遍去滑用生薑一兩同剉碎以水一大盞煎至六分去滓分溫二服不拘時候

時氣心腹痞滿論

夫時氣太陽少陰并病脉浮緊反入裏則作痞痞者心下滿也病發於陰者不可下下之則心下痞按之自軟但氣痞耳故不可下也若熱毒氣乘心則心下痞滿面赤目黃狂言恍惚者此為有實宜吐下之

方

鼈甲散

出聖惠方

治時氣熱毒不退大便秘澀心腹痞滿

飲食不下精神昏亂恍惚狂言脉候洪數

整甲

塗醋炙令黃去褐爛

赤茯苓

桔梗

去蘆頭

人參

去蘆頭

檳榔

茵陳

白蘚皮

麥門冬

去心

川大黃

剉碎微炒各一兩

甘草

炙微赤剉

陳橘皮

湯浸去白瓤焙

枳殼

麩炒微黃去瓤各一兩

右為散每服五錢以水一大盞入生薑汁半分煎至

五分去滓不計時候溫服

前胡散

出聖惠方

治時氣心下痞滿胃膈不利

前胡

去蘆頭

赤芍藥 木香

青橘皮

湯浸去白

檳榔

各一兩

右為散每服五錢以水一中盞煎至六分去滓不計

時候溫服

半夏散

出聖惠方

治時氣若吐下後發汗後心下痞滿氣上

衝胃起即頭眩脉沈緊者

半夏

湯洗七遍去滑

白朮

甘草

炙微剉

赤茯苓

桂心

人參

去蘆頭

訶梨勒

用皮

前胡

去蘆頭各一兩

右為散每服五錢以水一中盞入生薑半分棗三枚

煎至六分去滓不計時候溫服

前胡散

出聖惠方

治時氣心腹痞滿身體疼痛煩熱嘔逆

前胡

去蘆頭

半夏

湯浸七遍去滑

枳殼

麩炒微黃去瓤

黃芩

人參

去蘆頭

桔梗

去蘆頭

檳榔

各一兩

赤芍藥

甘草

炙微赤剉各半兩

右為散每服五錢以水一中盞入生薑半分棗三枚

煎至五分去滓不計時候溫服

陳橘皮散

出聖惠方

治時氣已汗下後脾胃氣虛心下痞

滿腹中雷鳴

陳橘皮

三兩湯浸去白瓤焙

人參

半兩去蘆頭

乾薑

炮剉

甘草

炙微赤剉

半夏

湯洗七遍去滑

赤茯苓

桔梗

去蘆頭

白朮

木香

各一兩

右為散每服五錢以水一中盞煎至六分去滓不計

時候溫服

桔梗散

出聖惠方

治時氣心腹痞滿氣喘痰涎不絕

桔梗

去蘆頭

半夏

湯洗七遍去滑

赤茯苓

各三分

前胡

一兩去蘆頭

旋覆花

大腹皮

剉

枳殼

麩炒微黃去瓢

赤茯苓

甘草

炙微赤剉各半兩

右為散每服四錢以水一中盞入生薑半分煎至五

分去滓不計時候溫服

赤茯苓散

出聖惠方

治時氣氣壅上衝心腹痞滿坐卧不

安

赤茯苓

赤芍藥

紫蘇莖葉

各三分

枳殼

麩炒微黃去瓤

大腹皮

剉

甘草

炙微赤剉各半兩

百合

郁李仁

湯浸去皮尖微炒各一兩

右為散每服四錢以水一中盞煎至六分去滓不計

時候溫服

治時氣飲水過多水結心下痞滿

川大黃

剉碎微炒

川朴硝

各一兩

甘遂

一錢煨金黃

右為散每服不計時候溫服調下一錢以水利為度


治時氣飲水過多心下痞硬痛

用莞花半斤以醋拌令勻以慢火炒熟用帛裹熨之
冷即更炒以效為度

治溫氣痺腫

出本草

用赤小豆和桑根白皮煮食之



普濟方卷一百四十九

欽定四庫全書

子部
普濟方卷一百五十

詳校官太醫院恩糧臣孔毓秀

編修臣倉聖脈覆勘

總校官庶吉士臣何思鈞

校對官典簿臣劉景岳

謄錄監生臣費元震

欽定四庫全書

普濟方卷一百五十一

明

周王朱橚撰

時氣門

時氣宿食不消論

夫時氣吐之後或病新差脾胃氣皆虛不能化水穀致有宿食難消頭目多疼時發寒熱或心腹煩滿大腸結燥此皆是其候也

方

枳實散

出聖惠方

治時氣後脾胃氣虛心腹虛脹喫食不

消

枳實

麩炒令黃

人參

去蘆頭各一兩

乾薑

炮製

甘草

炙微赤剉

半夏

湯洗七遍去滑

木香

各半兩

白朮

桂心

桔梗

去蘆頭各三分

右為散每服四錢以水一中盞入生薑半分棗三枚

煎至六分去滓食前服

麥蘖散

出聖惠方

治時氣後宿食不消不思飲食

麥蘖

微炒

前胡

去蘆頭

白朮

檳榔

人參

去蘆頭

厚朴

去粗皮塗生薑汁炙令香熱各一兩

甘草

半兩炙微赤剉

右為散每服五錢以水一大盞入生薑半分煎至五

分去滓食前溫服

人參散

出聖惠方

治時氣後胃虛心膈壅悶時有寒熱宿

食不消

人參

二兩去蘆頭

大腹皮

一兩剉

枳實

一兩麩炒微黃

赤茯苓

訶藜勒用皮

白朮

桔梗去蘆頭各一兩

麥門冬

一兩半去心焙

甘草

半兩炙微赤剉

右為散每服五錢以水一大盞煎至五分去滓食前

溫服

白朮散

出聖惠方

治時氣後宿食不消心胸壅滯乍寒乍

熱

白朮

人參

去蘆頭

陳橘皮

湯浸去白瓤焙

大腹皮

剉

黃芪

剉

枳殼

麩炒微黃

甘草

炙微赤剉各半兩

訶梨勒用

皮

沉香

各一兩

右為散每服五錢以水一大盞煎至五分去滓食前

溫服

大黃散

出聖惠方

治時氣後宿食不消不思飲食

麥蘖

微炒

前胡

去蘆頭

白朮

檳榔

人參

去蘆頭

厚朴

去粗皮塗薑汁炙令香熟各一兩

甘草

半兩炙微赤剉

右為散每服五錢以水一大盞煎至五分去滓食前

溫服

厚朴丸

出聖惠方

治時氣後腸胃虛冷食不消化

厚朴

去粗皮塗生薑汁炙令香熟

人參

去蘆頭

枳殼

麩炒微黃去瓢

神麴

炒微黃

大麥蘖

炒微黃

杏仁

湯浸去皮尖雙仁麩炒微黃各一兩

乾薑

炮製

白朮

各一兩

甘草

半兩炙微赤剉

吳茱萸

桂心

各三分

右為散煉蜜和丸如梧桐子大每服食前以棗湯下

三十丸

白荳蔻九

出聖
惠方

治時氣後脾胃氣冷食不消化

白荳蔻

去
皮

草荳蔻

去
皮

白朮

人參

去蘆
頭

陳橘皮

湯浸去
白瓢焙

桂心

神麴

炒黃
三分

乾薑

炮
剉

甘草

炙微赤剉
各半兩

右為末煉蜜和丸如梧桐子大每服食前以薑棗湯

下三十丸

木香九

出聖
惠方

治時氣後脾胃虛冷宿食不消

木香

乾薑

炮製剉
各三分

人參

去蘆
頭

枳殼

麩炒微黃去瓢

麥蘗

炒黃熟

檳榔

各一兩

白朮

一兩半

甘草

半兩炙微赤剉

右為散煉蜜和丸如梧桐子大每服食前以薑棗湯

下三十丸

黑神散

出活人書

治瘟疫時氣有積食

巴豆

新好者一兩輕槌去皮以急流水兩碗浸一宿然後煮三五沸候冷瀝

出去心膜以帛拂去水然後研如膏用厚布十數重裹壓去油

豆豉

三兩新軟者為妙不得令乾與巴豆膏同細研

五靈脂

黑色者為上二分

大戟

半兩月生去皮其裏面如粉白者妙

三棱

半兩生用

杏仁

半兩燒過後入蒜煮研

右三味為極細末入巴豆豉研細後入杏仁更研細別入飛羅麪半匙以井花水調漸次拌藥和得所入臼中搗三二千下丸如菴豆大晾乾入瓶盒內或微火焙亦得如遇傷寒有食積者脉沈身體不熱即宜服之量患人臟腑虛實加減丸數服用薑棗湯吞下取微利為度不可太過溲泄身熱下之則為病氣

結胸若病在上可吐者同生薑乾嘔五丸

時氣煩躁論

夫時氣病煩躁者由陰氣少陽氣多故身熱而煩躁也
其毒氣在心上而煩躁者由陰氣少伸陽氣多故身熱
而煩躁也則令人悶而欲嘔者若其人胃內有燥結而
煩躁者或則譫語時遶臍痛其腹脹滿當察其證候而
治之也

方

竹葉湯

出聖
惠方

治時氣表裏未解煩躁不可忍者

竹葉

二兩

石膏

二兩

麥門冬

半兩
去心

生薑

半兩

半夏

湯洗七
遍去滑

人參

半兩
去
蘆頭

甘草

一分炙
微赤剉

陳橘皮

一分湯浸
去白瓤焙

右細剉和勻每服半兩以水一大盞煎至五分去滓

不計時候溫服

犀角散

出聖
惠方

治時氣頭目煩疼心神躁壅大小便不

利宜服

犀角屑

半兩

防風

半兩炙
微赤剉

檳榔

二兩

川升麻

一兩

秦艽

一兩
去苗

白蘚皮

一兩

甘草

半兩炙
微赤剉

川朴硝

二兩

木通

一兩
剉

右為散每服五錢以水一大盞入生薑半分煎至五

分去滓不計時候溫服

大黃散

出聖
惠方

治時氣表裏如火煩躁欲死宜服

川大黃

半兩剉
碎微炒

寒水石

半兩

川升麻

半兩

石膏

半兩

川朴硝

半兩

甘草

半兩炙
微赤剉

葛根

半兩

右為散每服不計時候以新汲水調下二錢

水解散

出聖惠方

治時氣煩躁頭痛壯熱宜服

方見本門時氣二日類

大黃散

出聖惠方

治時氣壯熱不解心神煩躁宜服

川大黃

半兩剉碎微炒

黃連

半兩去鬚

麥門冬

一兩去心

梔子仁

半兩剉

柴胡

一兩去苗

甘草

半兩炙微赤剉

右為散每服五錢以水一大盞入豉半合葱白二莖

煎至五分去滓不計時候溫服

苦參散

出聖惠方

治時氣壯熱不解心神煩悶毒氣在胃

膈宜服

苦參

一兩剉

黃芩

一兩

川升麻

二兩

右為散每服五錢以水一大盞煎至五分去滓不計

時候溫服頻服當吐為效

治時氣已五六日心神煩躁不解

出聖惠方

竹瀝

半小盞

新汲水

半小盞

右相和令勻不計時候頓服

又方

出聖惠方

用大地龍二條破腹去泥細切似小豆大小便一中
盞煮令熟去滓不計時候溫服

又方

出聖惠方

鷄子清

一枚

芒硝末

一錢

右以新汲水半盞調服一方用新汲水三合調服

竹葉湯 治煩躁而渴不止惡寒但熱盛者崔氏療常

用亦佳不徒療天行凡虛羸病及病後胃上痰熱者

服之皆妙

甘草

兩一

黃芩

兩一

棗

十五枚擘

半夏

一兩洗

芍藥

兩三

前胡

兩一

小麥

五合

人參

兩二

粳米

升一

知母

兩二

栝樓

兩一

生薑

兩四

麥門冬

四兩去心

竹葉

一把須用竹葉入水煮湯不用其藥

右切以水一斗五升煮取五升分五服若天行而虛羸久病胃上痰熱亦可服之加黃芪二兩除黃芩減知母一兩除栝樓用之大效忌羊肉海藻松菜

救生散 治疫癘病壯熱煩躁頭痛體疼

人參 五味子

白朮 各半兩

麻黃 去根節三兩

桂 去粗皮

厚朴 去粗皮薑汁炙

大黃 剉炙各二兩

附子 麩炒去皮失

甘草 炙各二兩

右搗羅為散每服三錢匕新汲水調下後用熟水嗽口良久喫生薑熱茶一盞以綿被覆之如陽毒汗出陰毒瀉下立差

治時氣表裏大熱欲死方

大黃 寒水石 芒硝 石膏

升麻 麻黃 葛根 紫葛

右各搗篩水服方寸匕

發汗麻黃湯 治天行壯熱煩悶

麻黃

五兩
去節

葛根

四兩

梔子

二十一
枚擘

葱

切一
升

香豉

一升
綿裹

右咬咀以水八升先煮麻黃葛根三味沸去沫內諸藥煎二升五合去滓分為三服別粗去如人行五

十里更進一服不利覆取汗後以粉粉身忌風及諸
熱食

葛根解肌湯

出肘
後方

葛根

四兩

芍藥

二兩

麻黃

一兩
去節

大青

一兩

甘草

一兩
炙

黃芩

一兩

石膏

一兩
研

桂心

一兩

大棗

四枚
擘

右切以水五升煮取二升分溫三服相次服之覆取
汗差忌海藻松菜

治天行病心悶

出本
草

以水中細草搗絞汁服之

治時氣熱毒心神煩躁

出肘
後方

取生杼木削去黑皮細切裏白者一升以水二升五

合煎去滓一服八合三服

又方

出肘
後方

取朮丸子二七枚以水五升按之熱去滓食服汗吐

即愈

又方

出肘
後方

取古錢一百五十七枚以水一斗煮取七升服汁
盡之須臾復以五升水更煮令得一升以水二升投
中合得三升出錢飲汁當吐毒出也

又方

出肘
後方

取猪膽膏如彈子大者溫服之日三服三日九服

勝金湯

出肘
後方

治時氣病熱狂言心躁

用苦參不拘多少炒黃色為末每服二錢水一盞煎

金匱要略卷之五
至五分溫服連煎三服者有汗無汗皆差

治天行病心悶

出本草

以絡石草煎服

治時氣五六日心神煩躁不解

用竹瀝半盞新汲水半盞和勻服之

時氣煩渴論

夫時氣煩渴者此由熱氣入於腎臟故也腎惡燥今熱氣盛則腎燥腎燥故渴而引飲也

方

知母散

出聖
惠方

治時氣頭疼骨肉煩疼口燥心悶外寒

內熱已自下利由有虛熱未退煩渴不止宜服

知母 人參

去蘆
頭

地骨皮 葛根

剉

甘草

炙微赤剉
各一兩

石膏

三兩

薤白根

二兩

右為散每服五錢以水一大盞入生薑半分煎至五

分去滓不計時候溫服

赤芍藥散

出聖
惠方

治時氣數日不解心燥渴小腹脹急

臍下悶痛宜服

赤芍藥 知母 黃芩 玄參 麥門冬

去心

柴胡

去苗各三分

石膏

二兩

甘草

三分炙微赤剉

右為散每服四錢以水一中盞入生薑半分竹葉三七片煎至五分去滓不計時候溫服

柴胡散

出聖惠方

治時氣頭痛骨肉煩疼口燥心悶外寒

內熱已自下利由有虛熱未退煩渴不止宜服

柴胡

一兩去苗

川升麻

三分

黃芩

三分

石膏

二兩

麥門冬

一兩
去心

犀角屑

三分

葛根

三分
劉

甘草

三分
炙
微赤劉

右為散每服五錢以水一大盞入葱白二莖竹葉二

七片煎至五分去滓不計時候溫服

赤茯苓散

出聖
惠方

治時氣頭痛雖時有汗煩渴不止宜服

赤茯苓

二兩

甘草

炙微
赤劉

澤瀉

桂心

葛根

劉各
一兩

石膏

二兩

右為散每服五錢以水一大盞煎至五分去滓不計

時候溫服

猪苓散

出聖惠方

治時氣煩熱煩渴欲飲水小便不利

猪苓

去黑皮

赤茯苓

澤瀉

阿膠

搗碎炒令微黃

滑石

各一兩

右為散每服五錢以水一大盞煎至五分去滓不計

時候溫服

麥門冬散

出聖惠方

治時氣壯熱煩渴

麥門冬

二兩去心

五味子

一兩

人參

一兩去蘆頭

石膏

二兩

甘草

一兩炙
微赤剉

右為散每服三錢以水一中盞煎至六分去滓不計

時候溫服

土瓜根散

出聖
惠方

治時氣大熱心胃煩渴

土瓜根

半兩

乾棗

五枚

麥門冬

半兩
去心

甘草

三分炙
微赤剉

豉

半合

右細剉和勻每服半兩以水一大盞煎至五分去滓

不計時候溫服

治時氣煩渴不止方

出聖惠方

地骨皮

半兩

阿膠

半兩搗碎炒微黃

葱白

二莖并鬚

右細剉和勻每服半兩以水一中盞煎至五分去滓

不計時候溫服

治時氣煩渴身熱頭痛嘔逆不能下食宜此方

出聖惠方

柴胡

二兩半去苗

赤茯苓

二兩

枳殼

二兩麩炒微黃去瓢

甘草

二兩炙微赤剉

麥門冬

二兩去心

右為散每服五錢以水一大盞入生薑半分煎至五

分去滓不計時候溫服

升麻散

出聖
惠方

治時氣下後煩渴不止

川升麻

三分

知母

三分

甘草

三分炙
微赤剉

石膏

一兩
半

葛根

一兩
剉

右為散每服五錢以水一大盞入竹葉三七片粳米

一百粒煎至五分去滓不計時候溫服

葛根散

出聖
惠方

治時氣煩渴飲食即吐心胃不利宜服

葛根

剉

猪苓

去黑
皮

赤茯苓

桂心

白朮 澤瀉

蘇蘇

各一兩

右為散每服不計時候以溫水調下二錢令至飲水

小便利汗出便愈

又方

出聖惠方

黃連

一兩去積

蘇蘇根

一兩

右為末煉蜜和丸如梧桐子大每服不計時候煎大

麥湯溫下三十丸

治時氣煩渴不止方

出聖惠方

葛根

二兩
剉

葱白

五莖
切

右以水二大盞煎至一大盞去滓內白粳米半合豉半合以生絹裹煎良久候爛去米豉放冷不計時候溫服

治時氣煩渴不止方

出聖
惠方

取生藕搗絞取汁一中盞入生蜜一合攪勻不計時候分二服

芍藥湯神方 治毒溫病及吐下後有餘熱煩渴

芍藥

五分

黃連

四分

甘草

二分炙

黃芩

二兩

桂心

二兩

桔樓

二分

右切以水五升煮取三升分三服一日令盡忌豬肉

冷水海藻松菜生葱等

乾糞湯

一名破棺湯

解大熱天行病若大困患舌燥如鋸

極渴不能服藥者宜服

用陳久乾人糞一升以沸湯一大升沃糞一食久澄

清瀝取一升頓服如渴不止者又依前法更服此灸

從心厭骨下一寸半名巨闕取患人中指節為寸灸
三十壯若無心厭骨則以中指節前量橫括心上岐
骨上兩頭築著骨當橫量下前一寸當中直下則是
巨闕也

時氣鼻衄論

夫時氣鼻衄者由五臟結熱所為心主於血邪熱中於
手少陰之經客於足陽明之絡故衄血也衄者血從
鼻中出也

方

石膏飲子

出聖惠方

治時氣鼻衄煩躁不止頭痛氣逆

石膏

搗碎

竹茹

各二兩

甘草

炙微赤剉

桂心

各半兩

赤芍藥

柴胡

去苗

黃芩

各一兩

生地黄

三兩

右剉碎和勻每服半兩先以水一大盞半浸伏龍肝二兩澄清一大盞煎至五分去滓不計時候溫服

治時氣心肺中熱鼻衄不止

出聖惠方

胡粉

炒令黑
細研

乾薑

炮製到
為末

亂髮灰

細研

釜底墨

細研

伏龍肝

細研各
少許

右藥末少許吹入鼻中便止若吹一大豆許更效

治時氣鼻衄心膈躁悶面赤目黃起卧不定

烏賊魚骨

刺蘇

蒲黃

各二
兩

右為散每服不計時候以冷粥飲調下二錢頓服以

定為度

治時氣鼻衄諸藥無效者宜服此方

白馬通

七枚紋
取濃汁

阿膠

半兩槌碎炒
今黃牒為末

右同和熟欖以滴鼻中仍用新汲水微浸足即止

治時氣鼻衄日夜不止面色如黃金

出聖
惠方

取韭根一握搗取汁瓶中盛以索懸於井中浸良久
急取出滴二七滴鼻中即止

治時氣卒患鼻衄不止

出聖
惠方

以鬱金為末每服不拘時候以冷水調下二錢以定
為度

又方

出聖惠方

熟艾

一鷄子大

牛皮膠

一片如手大許碎炒令黃燥

右以豉汁二大盞煎至一大盞去滓分溫二服

清涼散 治時氣頭目昏疼久積熱毒鼻口中出血

大黃

剉

芍藥

各一兩

麻黃

去根節煎去沫一兩

右為散每服一錢匕沙糖冷水調下食後服

生地黃飲 治時疾壯熱頭疼鼻血不止

生地黃汁 生藕汁 生薑汁 生蜜

各三合

右和勻分作三服每服微煎過食後臨卧服

治天行毒病鼻血是熱毒血下數升者病源天行衄血

者五臟熱結所為心主於血邪熱中於手少陰之經

客於足陽明之絡故衄血者血從鼻出也

出肘後方

右勿療自瘥亦無所苦亦可取好松煙墨搗之以鷄

子白和丸如梧桐子大水下一服十丸並無所忌或

用生地黃汁下二十九

大病差後小勞便鼻衄方

出肘後方

左顧牡蠣

十分

石膏

五分

右搗末酒服方寸匕三四日亦可蜜丸如梧桐子大

服之

龍骨散

出嚴氏
濟生方

治時氣鼻衄三升以上恐多宜此藥止

龍骨

不拘
多少

右為細末用少許吹入鼻中九竅出血皆用此藥吹

之

時氣熱毒攻眼論

夫肝開竅於目肝氣虛熱毒氣則乘虛上攻於目故赤疼痛或生赤翳白膜瘕肉及瘡也

方

升麻散

出聖惠方

治時氣熱攻於肝臟目赤色痛宜服

川升麻

地骨皮

玄參

甘草

炙微赤剉

黃芩

赤茯苓

梔子仁

防風

羌活

桑根白皮

剉

決明子

各半兩

石膏

三兩

右為散每服五錢以水一大盞入竹葉二七片黑豆

五十粒煎至五分去滓不計時候溫服

梔子散

出聖惠方

治時氣熱毒未除心胃煩悶毒氣上攻

而眼赤腫宜服

梔子仁

黃連

去鬚

枳殼

麩炒微黃去瓢

赤芍藥

龍膽

去蘆頭

甘草

炙微赤剉

川大黃

剉碎微炒各半兩

右為散每服五錢以水一大盞煎至五分去滓食後

溫服之

羚羊角散

出聖惠方

治時氣肝臟虛熱眼昏赤痛宜服

羚羊角屑

赤茯苓

防風去蘆頭

麥門冬去心

甘草炙微赤剉

地骨皮

枳殼

麩炒微黃去瓢

薤仁

各半兩

右為散每服五錢以水一大盞煎至五分去滓入蜜

一茶匙更煎兩沸食後溫服

地骨皮散

出聖惠方

治時氣熱毒攻眼疼痛心中煩躁宜服

地骨皮 防風

去蘆頭

赤芍藥

葛根剉

羚羊角屑

川大黃

剉碎微炒各一兩

右為散每服五錢以水一大盞入豉五十粒葱白一莖煎至五分去滓食後溫服

治時氣熱毒攻眼不見物

出聖惠方

川升麻

一兩

決明子

一兩

細辛

半兩

黃連

一兩去鬚

犀角屑

半兩

麝仁

一兩

右為散每服食後以溫漿水調下二錢

洗眼竹葉湯 治時氣目赤疼痛及痒不可忍宜用

竹葉

二百片

秦皮

三片

防風

三分

甘菊花

三分

葳蕤

三分

蕤仁

三分

甘草

一分
生用

右細剉以水二大盞煎至五分以綿漚去滓避風處

洗眼目三五度差

獐猪膽點眼方

出聖惠方

治時氣熱毒攻眼中有努肉瞼

裏有瘡日夜下淚不見物

獐猪膽

一枚
汁

川朴硝

黃連末

半錢

龍腦

一豌豆大
研令細

右都研與猪膽相和勻浸一宿晝夜點眼若熱氣淚

至多當時便止

治時氣熱毒攻眼腫痛不可忍洗眼方

出聖惠方

以水煮蜂巢洗之日六七度甚效

獷豬肝貼眼方

出聖惠方

治時氣後因喫葵蒜熱麪損眼

暗不見物晝夜疼痛不可忍宜服

以獷豬肝一具薄切以清水浸淘如法貼眼瞼上乾

即換之連日及夜貼之重者不過一二日效

漏蘆連翹湯

治時氣熱毒變作赤色癰疽丹疹毒腫

及眼赤腫生障

漏蘆 連翹 黃芩 麻黃 白薇

升麻

甘草

各一兩

枳殼

大黃

各二兩

右㕮咀以水九升煮取三升分三服相去如人行五里久更服熱盛者可加芒硝二兩

時氣餘熱不退論

夫時氣病其人或未發汗吐下或經服藥以後而脉洪大實數腸胃脹滿小便赤黃大便秘難或煩或渴面色變赤

此為臟腑有結熱故也

方

大黃散

出聖惠方

治時氣餘熱不退發渴躁悶宜服

川大黃

剉碎微炒

梔子仁

犀角屑

麥門冬

去心

黃連

去須

甘草

炙微赤剉

地骨皮

黃芩

柴胡

去苗

白鮮皮

各一兩

右為散每服五錢以水一大盞煎至五分去滓不計

時候溫服

麥門冬散

出聖惠方

治時氣餘熱不散心膈時發煩躁宜服

麥門冬

去心

犀角屑

竹茹

黃芩

石膏

川大黃

劉碎微炒

川朴硝

甘草

炙微赤劉各一兩

右為散每服五錢以水一大盞煎至五分去滓不計

時候溫服

解肌散

出聖惠方

治時氣五七日頭痛餘熱不解宜

服

葛根

一兩劉

柴胡

一兩去苗

麻黃

三分去根節

赤芍藥

半兩

黃芩

半兩

甘草

半兩炙
微赤剉

桂心

半兩

石膏

二兩

右為散每服五錢以水一大盞入生薑半分煎至五分去滓不計時候溫服

知母散

出聖惠方

治時氣三五日餘熱不解心燥煩渴宜

服

知母

三分

川升麻

三分

鈎藤

一兩

地骨皮

三分

赤茯苓

三分

麥門冬

三分
去心

石膏

一兩

甘草

一分炙
微赤剉

右為散每服五錢以水一大盞入生薑三七片煎至

五分去滓不計時候溫服

犀角散

出聖
惠方

治時氣餘熱不解心煩燥渴表裏虛宜

服

犀角

一兩

葛根

一兩
剉

麻黃

一兩去
根節

黃芩

三分

甘草

半兩炙
微赤剉

右為散每服四錢以水一中盞煎至六分去滓不計

時候溫服

麻黃散

出聖
惠方

治時氣餘熱不解身體疼痛宜服

赤芍藥

二分

麻黃

三分
去根節

柴胡

一兩
去苗

赤茯苓

三分

地骨皮

三分

人參

一兩
去蘆頭

右為散每服四錢以水一中盞煎至五分去滓不計

時候溫服

麥門冬散

出聖
惠方

治時氣餘熱不解心膈壅悶四肢煩

熱宜服

川芒硝

一兩

麥門冬

一兩
去心

梔子仁

三分

枳殼

三分
麩炒微黃

黃芩

三分

甘草

半兩
炙微赤剉

右為散每服五錢以水一中盞入竹葉七片煎至五

分去滓不計時候溫服

又方

出聖
惠方

大青

三分
剉去心

枳殼

三分
麩炒微黃去瓢

黃芩

三分

川升麻

一兩

川朴硝

一兩

甘草

一分
炙微赤剉

右為散每服五錢以水一大盞煎至五分去滓不計

時候溫服

葛根散

出聖惠方

治時氣餘熱不解頭重宜服

葛根

一兩對

赤芍藥

一兩

黃芩

一兩

梔子仁

一兩

豉

二合

右為散每服五錢以水一大盞煎至五分去滓不計

時候溫服

治時氣十數日餘熱不解或時發寒熱宜服方

出聖惠方

歲莖

一兩

柴胡

一兩去苗

羚羊角屑

三分

石膏

一兩半

黃芩

一兩

甘草

半兩炙微赤剉

右為散每服五錢以水一大盞入生薑半分煎至五分去滓不計時候溫服

蘇蘇根散

出聖惠方

治時氣餘熱不退

蘇蘇根

一兩

柴胡

三分去苗

地骨皮

一兩

枳殼

半兩麩炒微黃去瓢

赤茯苓

一兩

鹽甲

一兩塗酥炙金黃去裙襴

右為散每服五錢以水一中盞煎至五分去滓入生

地黃汁半合更煎一兩沸不計時候溫服

大黃丸

出聖
惠方

治時氣餘熱不退發渴不止大便秘澀

宜服

川大黃

三兩剉
碎微炒

柴胡

去
苗

黃芩

秦艽

去
苗

黃連

去
鬚

白蘚皮

梔子仁

龍腦

去
蘆
頭

赤芍藥

麻黃

各一
兩

右為末煉蜜和丸如梧桐子大每服不計時候以竹葉湯下三十丸以利為度

柴胡丸

出聖惠方

治時氣餘熱不退煩躁發渴四肢無力

不能飲食

柴胡

去苗

桔梗

去頭蘆

子芩

赤芍藥

黃芪

剉

枳殼

麩炒微黃去瓢

鼈甲

塗酥炙金黃去裙襴

人參

去蘆頭各一兩

甘草

半兩炙微赤剉

右為末煉蜜和丸如梧桐子大每服不計時候溫水

下三十丸

治時疾內外熱不解

出本草

以柴胡單煮服之良

生地黃湯 治天行二七日外至三七日不歇或寒或熱來去噤噤四肢羸瘦飲食不能腹中虛滿熱毒不安宜服

生地黃

升汁一

生麥門冬

升汁一

赤蜜

升一

人參

兩二

白朮

兩三

桂心

兩一

甘草

兩二
炙升

升麻

兩三

薄荷

升一

石膏

兩八
綿裹兩碎

生地骨皮

兩四

右細切以水九升煮諸藥取二升去滓下地黃汁更煎三兩沸分溫五服晝四夜一忌蕪荑生葱海藻松菜桃李雀肉等物

鼈甲湯 治天行三七至四七日勞瘡未歇熱毒不止乍寒乍熱乍劇乍瘥發動如瘡

鼈甲 三兩 炙

大青 三兩

石膏 八兩 碎 綿裹

牡丹皮 二兩

烏梅肉 一兩

常山 三兩

竹葉 切 一升

牛膝根 三兩

甘草 一兩

香豉

一升綿
裹熬

右切以水九升煮取三升分溫三服日三服忌生葱
生菜鯉魚海藻松菜莧菜蕪荑一方有生天門冬生
地黃汁各一升

治時氣餘熱不解煩躁發渴四肢無力不能飲食

出聖
惠方

用牛蒡根搏絞取汁不計時候服一小盞

治天行壯熱

出本
草

以陳思岌煮食之

治天行熱疾

出本
草

以石蠹熟水磨服之

治天行寒熱

出本
草

取藍麩子乾擣為末食之

治天行時氣內外俱熱

出本
草

以前胡單煮服之

時氣發黃論

夫時氣病者因溫毒氣盛畜於脾胃有熱則新穀鬱蒸

不能消化大小便赤澁故身面變黃或如橘色或如桃
枝色也

方

秦艽散

出聖惠方

治時氣壯盛腹下硬滿不能飲食發黃

宜服

秦艽

去苗

柴胡

去苗

芎藭

桔梗

去蘆頭

葛根

黃芩

甘草

炙微赤剉

川大黃

剉碎微炒

桑根白皮

各一兩

右細剉和勻每服半兩以水一大盞煎至五分去滓
不計時候溫服

柴胡散

出聖
惠方

治時氣五六日壯熱骨節煩疼連心兩

肋氣脹急硬痛不能食變為黃宜服

柴胡

去
苗

枳殼

麩炒
微黃

蘇蘇根

黃芩

梔子仁

茵陳

龍膽

去蘆
頭

川大黃

剉碎炒
微黃

甘草

半兩炙
微赤剉

右為散每服五錢以水一大盞煎至五分去滓不計

時候溫服

梔子散

出聖
惠方

治時氣三日外若忽覺心滿堅硬脚手

心熱則變為黃不療殺人宜服

梔子仁 柴草 白蘚皮 黃芩

秦艽

去苗各
一兩

甘草

半兩炙
微赤剉

右為散每服五錢以水一大盞煎至五分去滓不計

時候溫服

苗陳丸

出聖
惠方

治時氣熱毒不退心胃躁悶變為黃宜

服

茵陳

一兩

川大黃

二兩到碎微炒

豉

一合

梔子仁

一兩

鼈甲

一兩塗醋炙令黃去裙襴

川芒硝

二兩

杏仁

一兩湯浸去皮尖雙仁麩炒微黃

右為末煉蜜和丸如梧桐子大每服不計時候以竹

葉湯下三十丸以利為度

大黃丸

出聖惠方

治時氣徧身發黃心膈煩熱宜服

川大黃

劉碎微炒

黃連

去鹽

黃蘗

劉

黃芩 麴衣 梔子仁

各一兩

右為末煉蜜和丸如梧桐子大每服不計時候以溫

水下二十九

治時氣發黃宜服此方

出聖惠方

甜葶藶

二兩隔紙炒令紅色

川大黃

二兩對碎微炒

右為末煉蜜為丸如梧桐子大每服不計時候以溫

水下二十九以利為度

又方

出聖惠方

以生小麥苗搗取汁每服一小盞日三四服即愈

治時氣三日外忽覺心滿堅硬脚手心熱則變微黃不

治殺人宜服此方名瓜蒂搗鼻法又治傷寒鼻塞頭

痛

出德生堂

取甜瓜蒂七枚為末用一大豆許大吹兩孔中令黃

水出殘末水調服之得吐黃水一二升即差

又方

出聖惠方

以萱草根苗搗絞汁二小盞分為三服以利為度

茵陳蒿散 治時氣發黃疼痛

茵陳蒿 黃芩 去黑心 梔子仁

大青 各一兩 大黃 剉 朴硝 各五兩

白蘚皮 葛根 剉 升麻 各一兩半

右為散每服二錢匕新汲水調下取利即瘥

茵陳黃芩湯 治時氣面黃腹堅氣急言語錯亂

茵陳蒿 大黃 蒸過 生麥門冬 去心

梔子仁 各四兩 青黛 升麻 各三分

黃芩

去黑心
二兩

右㕮咀如麻豆大每服二錢以水一盞半煎至八分去滓下芒硝末半錢更煎三沸溫服

許仁則療急黃此病始得與前天行病不多異五六日但加身體黃甚者涕淚汗唾小便如藥色眼白睛正黃其更重狀與天行病候重最者無別如至此困自須依前救治天行最重半夏七味湯救之若未至是者宜依後法急黃狀始得天行類天行病經三兩日

宜合麻黃等五味湯服之發汗以洩黃勢

麻黃

三兩
去節

乾葛

五兩

石膏

八兩
研末

生薑

六兩

茵陳

二兩

右切以水八升煮取升七合去滓分溫三服服相去
如人行十里久服訖欲汗則覆被取微汗以散之
依前麻黃等五味湯服之取汗汗出後未歇經三五日
又合梔子等五味湯以取利

梔子

二十枚
擘

柴胡

三兩

黃芩

三兩

茵陳

三兩

芒硝

六兩

右切以水八升煮四味取二升六合去滓內芒硝攪令硝盡分溫三服如人行十里更服之

療時疾發黃心狂煩熱悶不識人者

用大桔樓一枚黃老者以新汲水九合浸取汁下蜜半大合朴硝八分合攪令硝盡分再服便差

治時氣黃病發初唯覺四體沉沉不快須臾見眼中黃漸至面黃及舉身皆黃急令溺白紙即如藥染者此

熱毒已入內急治之若初覺便作

用瓜蒂赤豆散吹鼻中黃汁出數升者多瘥若深應
著其舌下兩邊有白脉彌處蘆刀割破之紫血出數
升亦歇然此須慣解剖者不解割忽係亂舌下青脉
血出不止便然人方可燒紡鐵以灼此脉令焦兼瓜
蒂雜巴搗為丸服之大小便亦去黃汁破灼已後禁
諸雜食又云有依黃坐黃須要分別之一方粥煮飲
之

又方

用醋酒浸鷄子一宿吞其白數枚

又方

竹葉

切五分

小麥

七分

石膏

三兩

右為末綿裹之以水五斗煮取七升一服七升盡

喫即瘥也

又方

生葛根汁

二升

梔子

三七枚

茵陳

一升切

右水五升煮取三升去滓內葛根汁分為五服

又方

用金色脚雌雞血引治如食法熱食寅飲汁令盡不
再作亦可下少鹽豉佳

茵陳湯 治時氣行瘀熱在裏鬱蒸不散化為發黃

茵陳

六兩

大黃

四兩

梔子仁

三錢

右呔咀每服四錢以水一盞半煎至八分去滓不拘
時候

茵陳黃連湯 治天行急黃身如金色

茵陳蒿

黃連

去鬚

黃芩

大黃

剉炒各一兩

甘草

炙剉

人參

各半兩

右麤搗篩每服五錢匕以水一盞半煎至一盞去滓

食後溫服之

梔子丸 治時氣病急黃及瘡瘡疫癘

茵陳 梔子

芒硝

各三分

大黃

蒸一兩一分

杏仁

去皮尖炒三分

豆豉

一分半湯浸別研

常山

鼈甲

醋炙各半兩

巴豆

去皮壓去油一分

右為末錫飴為丸如梧桐子大每服三丸飲下吐利為效未瘥加一九覺體有異急服之

茵陳丸

治天行熱病七八日成黃面目身體悉黃心

滿喘氣

茵陳

三兩

大黃

五兩

梔子仁

二兩

黃芩

二兩

常山

二兩

芒硝

二兩

巴豆

一兩去皮心炙

豉

三分

升麻

二兩

鼈甲

二兩炙

右搗篩以蜜和丸如梧子大每服三丸以得吐利則瘥忌葷菜生葱生菜野猪肉

秦朮湯 治天行三日外若忽覺心上妨滿堅硬脚手心熱則變為黃不療殺人

秦朮

兩一

紫草

兩一

白蘚皮

兩一

黃芩

兩一

梔子仁

兩一

右切以水一大升半牛乳一大升煮取七合分為二服老小以鍾量之一劑不愈更喫有效

治時行黃病

用冬葵子葉單煮汁服之

主疫氣結黃瘡瘴

以千里及煮服之

時氣毒氣攻手足論

夫時氣毒氣從臟腑中出攻手足則炘熱赤腫疼痛也
人五臟六腑其各輸皆出於手足指故毒氣從內出攻
手足也

方

治時氣毒攻手足赤腫疼腫痛欲斷方及傷寒

出聖患方

豉

半斤一作鹽豉

羊肉

一斤

右以水一斗同煮候肉熟以汁看冷暖得以漬手足日三度外臺秘要方用鹽豉一斤

又方

出聖患方

以掘地作坑子深三尺大小容兩足燒中令熱以酒灌坑中著履踞坑上衣擁勿令泄氣日再服之

又方

出聖
惠方

以羊肉桃葉煮取汁漬之加鹽少許尤佳一方鹽豉

尤好

治時氣熱毒攻手足腫熱疼痛欲死脫方

出聖
惠方

取虎杖二斤剉以水三斗煮取二斗去滓溫清手足

日三度

又方

出聖
惠方

以苦參一斤剉酒一斗煮五七沸去滓溫溫漬之日

三四度

治時氣熱毒攻手足㿔熱疼痛

用煮馬通汁漬之日三度

又方

出聖惠方

用猪膏和馬通塗之亦佳

治時氣熱毒攻手足腫痛似脫不可忍方

出聖惠方

用猪蹄一具去毛淨洗剉碎葱白一握切以水一斗

煮取五七沸去猪蹄等稍熱漬之外臺祕要方內鹽

少許肘後方同

又方

出聖惠方

用黃蘗半斤細剉以水三斗煮十沸用漬手足差外臺秘要方用黃蘗五斤水煮漬之

治時氣毒攻手足腫痛欲脫方亦治傷寒

出聖惠方

以生牛肉裹腫消痛止

神聖熱藥

一名裹白散
出御藥院方

治時疾

白花蛇肉

二錢

黑花蛇肉

二錢

紫色雄黃

二錢

錦文大黃

半兩

右各生用搗羅為細末大人每服三四錢水一盞半同煎三五沸食後稍熱服病大者每日三四服若十餘歲以下小兒每服一錢半至二錢煎服同法

治熱病手足腫欲脫者方兼主天行

出肘後方

用稻穰灰淋汁漬之佳

治熱毒攻手足腫痛欲脫方

出肘後方

取煮馬糞若羊糞汁漬之一方猪膏和羊糞塗之亦佳

時氣下痢論

夫時氣吐下之後表裏俱虛熱毒乘虛入於腸胃則下痢黃赤或下膿血遍身壯熱臍腹疼其脉數者自愈脉沉弦者必重脉大者為未止此皆熱毒氣所為也

方

升麻散

出聖惠方

治時氣熱毒攻於腸胃下痢不止

川升麻

當歸

剉微炒

黃連

去鬚微炒

桂心

赤芍藥

黃蘗

剉微炙

甘草

炙微赤剉各半兩

右為散每服半兩以水一大盞煎至五分去滓不計
時候溫服外臺秘要方治天行毒病酷熱下痢用水
三升煮取一升頓服之忌海藻菰菜猪肉冷水生葱
等物一名七物升麻湯

龍骨散

出聖惠方

治時氣諸痢不止宜服

龍骨

黃連

去鬚炒

黃蘗

微炙炒

當歸

剉炒

阿膠

杵碎炒令黃各三兩

右為散每服五錢以水一大盞煎至五分去滓不計

時候溫服

槲葉散

出聖惠方

治時氣大腸實熱下血不止臍下疼痛

宜服

槲葉

一斤

地榆

三分劉

木賊

三分劉

當歸

三分劉

赤芍藥

三分

伏龍肝

二分

右為散每服不計時候以粥飲調下二錢

黃連散

出聖惠方

治時氣四五日大熱下痢宜服

黃連

去鬚微炒

黃蘗

微炒

艾葉

微炒

黃芩

各一兩

龍骨

二兩

右為散每服不計時候以粥飲調下二錢

木香散

出聖
患方

治時氣熱毒痢膿血腹中疼痛宜服

木香

半兩

黃連

一兩去
翳微炒

青橘皮

半兩湯浸
去白瓤焙

梔子仁

一分

地榆

半兩

右為散每服不計時候以粥飲調下二錢

黃連丸

出聖
患方

治時氣熱毒痢宜服

黃連

二兩去
翳微炒

當歸

一兩剉
微炒

黃芩

一兩

赤石脂

一兩

龍骨

一兩

右為末煉蜜和丸如梧桐子大每服不計時候以粥

飲下三十丸

治時氣下痢不能食方

出聖惠方

烏梅肉

十枚
微炒

黃連

二兩去
積微炒

右為末煉蜜和丸如梧桐子大每服不計時候以粥

飲下十丸

黃連湯

出聖惠方

治時氣熱毒下痢

當歸

炒 二兩

黃連

炒 二兩

黃蘗

剉炙 二兩

右為散每服五錢以水一大盞煎至五分去滓入蜜一茶匙再煎一兩沸溫服不計時候外臺秘要方治天行諸下痢可用水六升煮取三升去滓內蜜一合微火煎取二升半分三服良驗忌猪肉冷水

治時氣赤白痢方

出聖惠方

鼈甲

二兩塗醋炙黃去裙襖

阿膠

一兩碎炒令黃燥

赤小豆

一合炒熟

右為散每服不計時候以粥飲調下三錢

雄黃丸 治時氣熱毒下痢赤白及下部毒氣下細蟲

如布絲長四五寸黑頭銳尾

雄黃

研一分

丹砂

研

乾薑

炮

附子

炮製去皮
臍各半兩

右搗研為末煉蜜和丸擣五百下丸如菉豆大每服
十九空心米飲下

麝香丸 治天行熱毒下痢赤白久下膿血及下部毒

氣常下細蟲如布絲縷大或長四寸黑頭銳尾

麝香

一分

附子

三分炮

雄黃

丹砂

乾薑

各二分

右五味各搗下篩訖復更合治之蜜和丸如小豆大
每服一丸老小半之效驗忌猪肉生血等物

治天行四五日大下熱病痢

方見本門時氣四日類黃連青龍湯同

竹茹飲 治痢後得天行頭痛三四日食即嘔吐者

竹茹

二兩

橘皮

二兩

生薑

四兩

人參

二兩

蘆根

切一升

粳米

一合

右切以水六升煮取二升五合去滓分溫五六服中

間任食忌熱麵生冷

時氣下部蠱瘡論

夫時氣下部瘡者蠱由熱毒結在腹中穀氣衰毒氣盛
三蟲動作長食人五臟多冷洩痢下部生瘡痒不暫
止若唇内生瘡但欲寐者此蟲蝕下部也重者則肚爛
傷於五臟也即死也

方

雄黃散

出聖惠方

治時氣蠱蝕下部生瘡宜服

雄黃

半兩細研外一方用醋炙

青箱子

三兩

苦參

三兩剉

黃連

三兩去鬚微炒

杏仁

一兩半湯浸去皮尖雙仁麩炒微黃外一方用桃仁

右為散每服食前粥飲調下二錢外臺秘要方搗篩

綿裹如半棗核大內下部亦可米汁服方寸一日三服

忌猪肉冷水及熱麩炙肉蒜等物

毒病下部生瘡者

出肘後方

搗蛇莓汁服之三合日三水漬烏梅令濃并內崖蜜數數飲之

治天行下部生瘡爛方

出肘後方

搗烏梅

二十七枚去核

大蒜

二十枚

屋塵

半升篩取細者

右搗篩為散苦酒一升和調於銅器中煎成膏作長

挺內下部

治時氣下部匿瘡疼

出聖惠方

桂心

二兩

藍葉

二兩

右為末分為三服以生猪肝半斤去膜細切拌藥一服入五味同煮每日早晨一服當於下部中出蟲如髮一合已來便差外臺秘要方治天行蠱病用吹咀水一斗煮取二升內猪肝十兩去膜細研著湯中和令相得臨時小溫若毒悉在腹內盡服之在下部者三服藥中用一分竹筒內下部中服藥一時間當下細蟲如髮大五六升小兒半之忌生葱一名桂枝湯

治時氣痢膿血下部生蠱瘡蟲方

出聖惠方

黃連

三分去鬚微炒外
臺秘方作三兩

蠟一
兩

烏梅肉

三兩
微炒

右為末化蠟和蜜為丸梧桐子大每服食前以粥飲
下三十丸晚再服之外臺秘要加至四十丸瘡忌猪
肉冷水一名黃連丸

治時氣下部蠱瘡方

出聖
惠方

用馬蹄燒為灰為末以猪肉脂和塗之一日可五六
遍即瘥

治時氣病下部蠱瘡痛不止

出聖惠方

用濃煮桃枝皮取汁煎如調餚以通下部中若口瘡

含之差亦治熱病下部生瘡

治傷寒蠱病兼治蛔蟲攻心臍如刺口吐清水

出千金方

取生鷄子小頭叩出白入漆一合熟和攪令極調沫

出更內著殼中仰吞之食頃或半日乃吐下蟲劇者

再服蟲盡熱除病愈

毒病下部生瘡者

出肘後方

燒鹽以薰導之不透又以綿裹熨之

又方

出肘後方

用生漆塗之綿導之

又方

出肘後方

大丸灸下部

又方

出肘後方

取蜊三升水五升得二升半盡服之

又方

出肘後方

取水中荇葉搗綿裹導之日五易瘥

又方

出肘後方

用欖皮槲皮煮汁粘糖以導之又濃煮桃皮飲之最

良

猪膽苦酒湯

出千金方

治熱病有蠱上下攻移殺人

用猪膽一具苦酒半升和之大煎令沸三上三下藥成放溫空心服飲三滿口蟲死便愈

治傷寒熱病多睡變成溫蠱四肢煩疼不得食

出千金方

用羊桃十觔切搗令熟暖湯三升掩浸之日正午時
入中坐一炊久不過三度瘥

青箱散

出千金方

治熱病有蜚下部生瘡

青箱子

一斤

篇竹

二兩

藿蘆

四兩

甘草

一分

狼牙

三分

右搗篩米飲和每服一合日三服不知稍加之一方
無甘草有橘皮二兩

雄黃允散

出千金方

治時氣病蜚下部生瘡

雄黃

半兩

桃仁

一兩

青箱子

黃連

苦參

各半兩

右為末綿裹如棗核大內下部亦可棗汁服方寸匕

日三服

治溫病下部有瘡蟲蝕人五臟

出千金方

雄黃

皂莢

各一分

麝香

硃砂

各二分

右為末蜜和丸如梧桐子大幼得病酒服一丸日二

若下部有瘡日二

時氣大小便不通論

夫天行大小便不通此由脾胃有熱發汗太過則津液竭津液竭則胃乾燥結熱在內故大便不通又汗後津液虛少其人腸有伏熱故小便不通

方

廣濟柴胡散 治天行熱氣惡寒頭疼壯熱大小便澀

柴胡

分八

茵陳

分十

黃芩

分八

土瓜根

分十

白蘚皮

分八

青木香

分十

梔子仁

擘

分十

大黃

二十分

芒硝

十二分

右搗為散平晨空肚以新汲水服五六錢少時當一

兩行微利後煮葱豉稀粥食之熱如未歇明晨更服

四錢熱歇停藥忌熱食猪肉油膩等

柴胡湯 治天行惡寒壯熱頭痛大小便赤澀不下飲

食

柴胡

七分

茵陳

七分

大黃

十二分 別著

升麻

七分

梔子

四枚 擘

芒硝

四分 湯成下

芍藥

七分

黃芩

十二分

右切以水四升先漬藥一時猛火煮取二升五合分
溫三服服別相去如人行六七里喫一服以快利為
度第二服則利更不須服之忌熱食炙肉蒜粘食
近效主天行後兩脇脹滿

以炒鹽熨之如小便澁亦用鹽熨臍下如水腫以穀
枝汁服愈大效

滑石湯 治天行病腹脹滿大小便不通

滑石

十四分研

葶藶

一合紙上炒令紫色研

大黃

三分切

右切以水一大升煎取四合頓服

時氣大便不通論

夫時氣大便不通者由脾胃有熱發汗太過則津液竭
津液竭則胃中乾燥結熱在內則大小便不通也

方

羚羊角散

出聖惠方

治時氣熱毒在臟大腸不通宜服

羚羊角屑

一兩

柴胡

一兩

麥門冬

二兩去心

大腹皮

一两 剉

川大黃

一两 剉 碎微炒

川升麻

一两

甘草

半两 炙 微赤剉

右為散每服三錢水一中盞煎至六分去滓入元明粉一錢攪令勻不計時候溫服

大黃散

出聖惠方

治時氣十日已上腹微滿而喘臍下疼

痛大便不通宜服

川芒硝

二兩

川大黃

三兩 剉 碎微炒

羚羊角屑

一两

枳實

一两 麩炒微黃

桑根皮

一两

右為散每服五錢以水一大盞煎至五分去滓不計時候溫服以利為度

柴胡散

出聖惠方

治時氣惡寒頭痛壯熱大便不通宜服

柴胡

去苗

茵陳 木通 土瓜根

白蘚皮

梔子仁

各一兩

川大黃

三兩剉碎微炒

川芒硝

二兩

右為散不計時候以溫水調下三錢少時當利一兩行者煮蔥頭稀粥飲之如熱未歇再服

大麻仁丸

出聖惠方

治時氣胃中煩熱大便不通宜服

大麻仁

二兩研

川大黃

二兩

郁李仁

一兩湯浸

槐寄生

川朴硝

枳殼

麩炒微黃去瓤

木通

各一兩

右為末入大麻仁等令勻煉蜜和丸如梧桐子大每服不計時候以溫酒調下二十丸

調氣丸

一名承氣丸出聖惠方

治時氣十餘日不大便

川芒硝

二兩

枳實

一兩麩炒微黃

川大黃

二兩剉

杏仁

二兩湯浸去皮尖雙仁麩炒微黃研如膏

右為末煉蜜和丸如梧桐子大不計時候以溫水下三十丸如未利再服

治時氣熱毒在胃大便不通

出聖惠方

川大黃

一兩剉碎微炒

川芒硝

一兩

右細剉以水一大盞浸一宿明早煎五七沸綿濾取汁不計時候溫服

時氣小便不通論

夫時氣小腸者心之腑也心與小腸為表裏心臟熱久而不除汗後津液虛少不能灌溉而熱毒之氣流注小腸故令不通也

方

赤茯苓散

出聖惠方

治時氣有時寒熱四肢沈重口不知

味胸中噦塞小便不通宜服

赤茯苓

二兩

前胡

三分去蘆頭

白蘚皮

一兩

蘧麥

一兩

子芩

半兩

梔子仁

半兩

滑石

二兩

川升麻

三分

木通

一兩半剉

右為散每服三錢以水一盞煎至六分去滓不計時候溫服

具齒散

出聖惠方

治時氣熱毒流注小便不通宜服

具齒

四十枚

白蘚皮

一兩

猪苓

一兩去皮

川大黃

一兩剉碎微炒

蘆麥

一兩

右為散每服不計時候以水一中盞半調下三錢良久再服以利為度

犀角散

出聖
惠方

治時氣四五日寒熱頭痛心腹煩悶小

便不通

犀角屑

柴胡

去苗

赤芍藥

蘼麥

黃芩

知母

木通

剉各
一兩

川大黃

二兩剉
碎微炒

滑石

二兩

右為散每服五錢以水一中盞煎至五分去滓不計

時候溫服以得通為度

柴胡散

出聖
惠方

治時氣惡寒壯熱頭痛小便不通

柴胡

去苗

茵陳

川大黃

剉碎

黃芩

木通

剉

川升麻

梔子仁

川芒硝

茅根

剉各一兩

右為散每服五錢以水一大盞煎至五分去滓不計

時候溫服以得通為度

治時氣壅毒心腹脹滿小便不通

出聖惠方

滑石

二兩

甜葶藶

一兩隔紙炒令紫色

右搗篩以水二大盞煎至一盞去滓不計時候溫服

以得通為度

療小腹滿不得小便方兼治天行

細末雄黃和蜜為丸棗核大內溺孔中令入中等半
寸以竹管注陰令痛搦之通



普濟方卷一百五十